

Disinfettante per capezzoli pronto all'uso dopo la mungitura e la disinfezione della pelle

Descrizione del prodotto

Keno™din SD è un disinfettante per capezzoli pronto all'uso da utilizzare dopo la mungitura su animali che producono latte e disinfettante della pelle pronto all'uso, da utilizzare soltanto su pelle integra:

- mammelle di bovini da latte e da carne prima della figliatura
- mammelle di scrofe prima del parto

Caratteristiche

Principio attivo secondo regolamento 528/2012: Iodio (cas: 7553-56-2) 0,3% w/w.
Utilizzare in PT3 (Biossidi per campo veterinario). Solo per uso professionale. Formulazione: AL – Altri liquidi.
Numero di autorizzazione: EU-0022265-0006 1-4

Modalità d'uso

Il prodotto è pronto per l'uso.
Prima dell'uso il prodotto deve essere portato a una temperatura superiore ai 20°C.

1. Per la disinfezione dei capezzoli (PT03. Organismo/i bersaglio: Bacteria, yeasts, viruses):

- Mediante immersione: Applicare il prodotto sui capezzoli immergendo il capezzolo nel bicchierino. Lavare il bicchierino dopo l'uso.
- Mediante spruzzatura: Applicare il prodotto sui capezzoli con uno spruzzatore manuale o con uno spruzzatore automatico. Non preparare più fluido di quanto effettivamente necessario. Ipotizzare 5 mL di soluzione per vacca per ciascun trattamento. Per il riempimento del prodotto nell'attrezzatura di applicazione si consiglia di utilizzare una pompa dosatrice. Il prodotto deve essere usato direttamente dopo la mungitura usando un bicchierino oppure uno spruzzatore automatico o manuale. Assicurarsi che il capezzolo sia ricoperto completamente fino a tre quarti della sua lunghezza. Il prodotto viene applicato dopo la mungitura: 2 volte al giorno in caso di spruzzatura manuale e 3 volte al giorno se applicato per immersione manuale e spruzzatura con robot. Lasciare asciugare il prodotto sui capezzoli. Per garantire un tempo di contatto sufficiente, fare attenzione a non rimuovere il prodotto dopo l'applicazione (ad esempio, mantenere l'animale in piedi per almeno 5 minuti).

2. Per la disinfezione della pelle (PT03. Organismo/i bersaglio: Bacteria, yeasts) :

Prima dell'uso il prodotto deve essere portato a una temperatura superiore ai 20°C. Per il riempimento del prodotto nell'attrezzatura di applicazione si consiglia di utilizzare una pompa dosatrice.

Applicare mediante spruzzatura sulla pelle intatta dell'animale per una disinfezione topica:

- sulle mammelle di bovini da latte e da carne prima della figliatura: 1 spruzzo su ciascun capezzolo (equivalente a 4,8 mL per applicazione). La disinfezione ha luogo una sola volta un giorno prima della figliatura, e una sola volta un giorno dopo la figliatura. Per garantire un tempo di contatto sufficiente, fare attenzione a non rimuovere il prodotto dopo l'applicazione (ad esempio, mantenere l'animale in piedi per almeno 5 minuti).
- sulle mammelle di scrofe prima del parto: Ipotizzare da 15 a 20 mL per animale, una volta al giorno un giorno prima del parto e una volta al giorno ogni giorno per 4 giorni dopo il parto. Per garantire un tempo di contatto sufficiente, fare attenzione a non rimuovere il prodotto dopo l'applicazione (ad esempio, mantenere l'animale in piedi per almeno 5 minuti).

Lasciare asciugare il prodotto sulla pelle.

Utilizzare solo su pelle integra.

Non miscelare con altre sostanze chimiche.

Tutti i prodotti non sono disponibili in ogni paese. Se vorrebbe ottenere più informazione sulla disponibilità del prodotto particolare, si prega di consultare il vostro rappresentante CID LINES.



Specificazioni

| | |
|---------------------|--------------|
| Stato fisico | Liquido |
| Colore | Marron scuro |
| pH | ca 5.3 |
| Densità | ca 1.02 kg/l |
| solubilità in acqua | 100 % |

Conservazione ed eliminazione

Conservare soltanto nel contenitore originale in luogo fresco e ben ventilato. Tenere il contenitore chiuso quando non in uso. Proteggere dal gelo. Non esporre a temperature > 40°C. Al termine del trattamento, smaltire il prodotto inutilizzato e l'imballaggio secondo le disposizioni locali. Il prodotto usato può essere scaricato nella rete fognaria urbana o smaltito presso un deposito di letame in conformità con i requisiti locali. Evitare il rilascio in un singolo impianto di trattamento delle acque reflue.

Istruzioni di sicurezza per l'utilizzatore

Tenere fuori dalla portata dei bambini. In caso di contatto con gli occhi: Sciacquare immediatamente con acqua.

In caso di ingestione: Sciacquare la bocca. Sputare.

Non si consigliano dispositivi di protezione particolari in condizioni normali d'uso.

Si prega di controllare la MSDS.

Utilizzare i biossidi accuratamente. Prima dell'uso, leggere l'etichetta e l'informazione del prodotto.

Tutti i prodotti non sono disponibili in ogni paese. Se vorrebbe ottenere più informazione sulla disponibilità del prodotto particolare, si prega di consultare il vostro rappresentante CID LINES.

Le informazioni in questa scheda tecnica sono corrette in base alla nostra migliore conoscenza. Proviamo a tenere questa informazione aggiornata e corretta secondo gli sviluppi più recenti. Non facciamo nessun avviso di garanzia, espresso o implicito, della completezza, dell'affidabilità o della pertinenza dell'informazione in questa scheda tecnica. Siete responsabili della fruizione che mettete in tale informazione. Non potremmo essere responsabile in nessun caso della perdita totale o danni (inclusi, senza limitazione, indiretti o della perdita della perdita dei profitti) derivanti di o in connessione con, l'utilizzazione delle informazioni e/o l'utilizzazione, la manipolazione, il trattamento o lo stoccaggio del prodotto. Sempre consultare la scheda della sicurezza e l'etichetta per più informazione.

